



Подготовка к вашей капсульной эндоскопии

A Планируйте заранее Звоните на **303-602-1926**, если у вас есть вопросы или вам необходимо назначить или перенести время вашего приема

- ✓ Ваш прием пройдет в Denver Health, Pavilion A, 777 Bannock Street, 2-й этаж. Парковка для пациентов/посетителей расположена в Delaware Garage
- ✓ Вы придете в GI Lab, для того чтобы получить капсулу, а затем вернуть капсулу, как только вы пропустите капсулу через ваш организм, и извлечете ее
- ✓ Вы получите 4 литра Colyte для подготовки к капсульной эндоскопии

B 3 дня перед капсульной эндоскопией

- ✓ Прекратите прием железосодержащих препаратов

C Накануне капсульной эндоскопии

- ✓ Прекратите прием антацидов (Tums, Rolaids), Пепто-Бисмола, и Карафата
- ✓ Утром вы можете позавтракать, как обычно
- ✓ **11.00:** ПЕЙТЕ ТОЛЬКО ЧИСТЫЕ ЖИДКОСТИ в течение остальной части дня и вечера. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ТВЕРДУЮ ПИЩУ
- ✓ Избегайте пить любые жидкости красного цвета
- ✓ **17.00-19.00:** Выпейте 2 литра из сосуда Colyte в течение 2 часов- это слабительное, и вам необходимо будет находиться рядом с туалетом

D День капсульной эндоскопии

- ✓ За 1 час перед вашей назначенной процедурой выпейте 1 литр Colyte
- ✓ Вы можете продолжать пить чистые жидкости. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ТВЕРДУЮ ПИЩУ
- ✓ Через 2 часа после того, как капсула была проглочена, выпейте последний литр Colyte
- ✓ После 13.00 вы можете легко перекусить
- ✓ На ужин вы можете кушать как обычно

E 8-72 часа после капсульной эндоскопии

- ✓ Прохождение капсулы обычно занимает 8-48, если капсула у вас не прошла после 72 часов, обратитесь в GI Lab
- ✓ Следуйте инструкциям для извлечения вашей капсулы после ее прохождения, и возвратите ее в GI Lab

