



Preparación para el procedimiento de la cápsula

A **Planifique con anticipación.** Llame al **303-602-1926** si tiene preguntas o necesita programar o cambiar su cita.

- ✓ Su cita es en Denver Health, Pabellón M, 723 Delaware Street, 2^{do} piso. El estacionamiento para pacientes y visitantes está en el sótano.
- ✓ Usted vendrá al Laboratorio Gastrointestinal (Laboratorio de GI o GI Lab) para tomar la cápsula y luego de nuevo para devolver la cápsula una vez que la cápsula haya salido de su cuerpo y la haya recuperado.
- ✓ Se le darán 4 litros de Colyte para que se prepare para el procedimiento de la cápsula.

B **3 días antes del procedimiento de la cápsula**

- ✓ Deje de tomar suplementos de hierro

C **El día antes del procedimiento de la cápsula**

- ✓ Deje de tomar antiácidos (Tums, Roloids), Pepto-Bismol y Carafate.
- ✓ Puede comer un desayuno normal por la mañana.
- ✓ **11 AM:** BEBA SOLAMENTE LÍQUIDOS CLAROS durante el resto del día y de la noche. NO COMA NADA SÓLIDO.
- ✓ Evite tomar líquidos de color rojo.
- ✓ **5-7 PM:** Beba 2 litros de Colyte en 2 horas. Puesto que Colyte es un laxante, tendrá que estar cerca de un baño.

D **El día del procedimiento de la cápsula**

- ✓ 1 hora antes de su procedimiento programado, beba 1 litro de Colyte.
- ✓ Puede continuar bebiendo líquidos claros. NO COMA NADA SÓLIDO.
- ✓ 2 horas después de la ingestión de la cápsula, beba el último litro de Colyte
- ✓ Después de la 1 pm, puede comer un bocadillo ligero.
- ✓ Coma normalmente la cena

E **8-72 horas después del procedimiento de la cápsula**

- ✓ La cápsula normalmente tardará de 8 a 48 horas en salir. Si la cápsula no sale después de 72 horas, póngase en contacto con el Laboratorio de GI.
- ✓ Siga las instrucciones para obtener su cápsula una vez que salga y devuélvala al Laboratorio de GI.

