



Preparación para su endoscopia superior

A Planifique con anticipación. Llame al [303-602-1926](tel:303-602-1926) si tiene preguntas o necesita programar o cambiar su cita.

- ✓ Su cita es en Denver Health, Pabellón M, 723 Delaware Street, **2do piso**. El estacionamiento para pacientes y visitantes está en el sótano.
- ✓ Usted necesitará un adulto que firme antes de llevarlo a casa después de su procedimiento. Su procedimiento deberá reprogramarse si no tiene un adulto para llevarlo a casa. Debemos hablar con el adulto que vaya a llevarlo a casa para verificar su disponibilidad.
- ✓ Puede esperar que el procedimiento tome de 1-1/2 a 2 horas.
- ✓ Consulte a su médico si tiene preguntas sobre cómo tomar sus medicamentos antes de la endoscopia.
- ✓ Si usa oxígeno o le han dicho que necesita usar oxígeno, debe traer con usted un tanque de oxígeno al procedimiento. Si no puede hacerlo, tendrá que reprogramar el procedimiento.

B El día ANTES de la endoscopia superior



No coma nada sólido durante 8 horas antes de su endoscopia

- ✓ Puede beber líquidos claros hasta 2 horas antes de la prueba.
 - ✓ Puede servirse agua, caldo, sopa, soda, Kool-Aid®, café o té (sin leche ni crema), paleta, gelatina, Gatorade u otros líquidos similares, ****nada de color rojo****.
- ✓ Confirme que tiene a alguien que firme y le lleve a casa después del examen.
- ✓ Si no puede asistir a la cita, por favor llame al laboratorio GI para reprogramar.

C El día de la endoscopia superior

- ✓ Puede tomar con sorbos de agua sus medicamentos matutinos, como medicamentos para la presión arterial o anticonvulsivos.
- ✓ Si usted es diabético, adminístrese 1/2 de su dosis de insulina habitual. **NO** tome medicamentos orales para la diabetes.

