



DENVER HEALTH™

est. 1860

Preparación para su sigmoidoscopia flexible

A **Planifique con anticipación.** Llame al **303-602-1926** si tiene preguntas o necesita programar o cambiar su cita.

- ✓ Su cita es en Denver Health, Pabellón M, 723 Delaware Street, **2^{do} piso**. El estacionamiento para pacientes y visitantes está en el sótano.
- ✓ Este es un procedimiento rápido que no requiere sedación ni otros medicamentos. **No** necesita que otra persona lo traiga ni lo acompañe para este procedimiento.
- ✓ Su consulta durará aproximadamente 1 hora.
- ✓ Necesitará una receta de Colyte. Obtenga Colyte en su farmacia una vez que haya programado su procedimiento.
- ✓ Hable con su médico si tiene preguntas sobre cómo tomar sus medicamentos antes del procedimiento.

B **El día ANTES de la sigmoidoscopia flexible**

- ✓ No hay restricciones alimenticias hasta **el día de** su procedimiento.
- ✓ Beba muchos líquidos extras durante todo el día antes del procedimiento.
- ✓ Prepare lo recetado según las instrucciones en la botella y guárdelo en el refrigerador durante la noche.

C **El día de la sigmoidoscopia flexible**



NO coma ningún alimento hasta después de su procedimiento

- ✓ Necesita comenzar a beber lo recetado (Colyte) por lo menos 4 horas antes de la hora de su cita.
- ✓ Le tomará por lo menos 2 horas beber la **MITAD** del galón de Colyte. DEBE terminar el **MEDIO** galón **2 horas** antes de la hora de la cita.
- ✓ Beba 1 vaso lleno (8 onzas) cada 15 minutos hasta acabarse la **MITAD** del líquido preparado. Esté cerca de un baño.
- ✓ Puede continuar bebiendo líquidos claros hasta la hora de su cita.
- ✓ Puede tomar sus medicamentos de la mañana 30 minutos después de terminar su Colyte.
- ✓ Es de suma importancia que siga estas instrucciones para eliminar todas las heces del recto.

GI Lab 723 Delaware Street Denver, CO. 80204 303-602-1926