



# ПОДГОТОВКА К ВАШЕЙ КАПСУЛЬНОЙ ЭНДСКОПИИ

**A Планируйте заранее** Звоните на **303-602-1926**, если у вас есть вопросы или вам необходимо назначить или перенести время вашего приема

- Вам назначен прием в медицинском центре для амбулаторных пациентов организации Denver Health на 3 этаже павильона L по адресу 660 N. Bannock St.; автостоянка находится за зданием.
- Вы придете в GI Lab, для того чтобы получить капсулу, а затем вернуть капсулу, как только вы пропустите капсулу через ваш организм, и извлечете ее.
- Вы получите 4 литра Colyte для подготовки к капсульной эндоскопии.

**B 3 дня перед капсульной эндоскопией**

- Прекратите прием железосодержащих препаратов.

**C Накануне капсульной эндоскопии**


- Прекратите прием антацидов (Tums, Rolaids), Пепто-Бисмола, и Карафата
- Утром вы можете позавтракать, как обычно
- **11.00:** ПЕЙТЕ ТОЛЬКО ЧИСТЫЕ ЖИДКОСТИ в течение остальной части дня и вечера. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ТВЕРДУЮ ПИЩУ
- Избегайте пить любые жидкости красного цвета
- **17.00-19.00:** Выпейте 2 литра из сосуда Colyte в течение 2 часов- это слабительное, и вам необходимо будет находиться рядом с туалетом

**D В день Капсульной процедуры (эндоскопии)**

- за 1 час до запланированной процедуры выпейте 1 литр Колита (Colyte)
- После того, как вы закончите эту порцию Колита (Colyte) - НИЧЕГО не ешьте и не пейте
- Через 2 часа после того, как вы проглотили капсулу, выпейте последний 1 литр Колита (Colyte). Теперь вы можете возобновить пить прозрачные жидкости.
- После 13:00 вы можете перекусить чем-нибудь легким.
- Ужинайте как обычно

**E 8-72 часа после капсульной эндоскопии**

- Прохождение капсулы обычно занимает 8-48, если капсула у вас не прошла после 72 часов, обратитесь в GI Lab
- Следуйте инструкциям для извлечения вашей капсулы после ее прохождения, и возвратите ее в GI Lab



## GI LAB

Denver Health  
Outpatient Medical  
Center, Pavillion L  
660 N. Bannock St.  
3rd floor

303-602-1926