

PREPARACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA CÁPSULA

A Planifique con anticipación. Llame al **303-602-1926** si tiene preguntas o necesita programar o cambiar su cita.

- La cita es en Centro Médico Ambulatorio de Denver Health, 660 N. Bannock St., Pabellón L. El estacionamiento para pacientes y visitantes está detrás del edificio.
- Usted vendrá al Laboratorio Gastrointestinal (Laboratorio de GI o GI Lab) para tomar la cápsula y luego de nuevo para devolver la cápsula una vez que la cápsula haya salido de su cuerpo y la haya recuperado.
- Se le darán 4 litros de Colyte para que se prepare para el procedimiento de la cápsula.

B 3 días antes del procedimiento de la cápsula

- Deje de tomar suplementos de hierro.

C El día antes del procedimiento de la cápsula


- Deje de tomar antiácidos (Tums, Roloids), Pepto-Bismol y Carafate.
- Puede comer un desayuno normal por la mañana.
- **11 AM:** BEBA SOLAMENTE LÍQUIDOS CLAROS durante el resto del día y de la noche. NO COMA NADA SÓLIDO.
- Evite tomar líquidos de color rojo.
- **5-7 PM:** Beba 2 litros de Colyte en 2 horas. Puesto que Colyte es un laxante, tendrá que estar cerca de un baño.

D Procedimiento para el día de la Cápsula

- 1 hora antes del momento en que esté programado su procedimiento, beba 1 litro de Colyte
- Después de terminar su Colyte, no coma ni beba NADA
- 2 horas después de ingerir la cápsula, beba el último litro de Colyte. Ahora puede volver a beber líquidos claros.
- Después de la 1 p.m., puede comer un bocadillo ligero
- Coma la cena como lo hace normalmente

E 8-72 horas después del procedimiento de la cápsula

- La cápsula normalmente tardará de 8 a 48 horas en salir. Si la cápsula no sale después de 72 horas, póngase en contacto con el Laboratorio de GI.
- Siga las instrucciones para obtener su cápsula una vez que salga y devuélvala al Laboratorio de GI.



GI LAB

Centro Médico
Ambulatorio de
Denver Health
660 N. Bannock St,
Pabellón L.

303-602-1926