

PREPARACIÓN PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA CÁPSULA

A Planifique con anticipación. Llame al **303-602-1926** si tiene preguntas o necesita programar o cambiar su cita.

- La cita es en Centro Médico Ambulatorio de Denver Health, 660 N. Bannock St., Pabellón L. El estacionamiento para pacientes y visitantes está detrás del edificio.
- Usted vendrá al Laboratorio Gastrointestinal (Laboratorio de GI o GI Lab) para tomar la cápsula y luego de nuevo para devolver la cápsula una vez que la cápsula haya salido de su cuerpo y la haya recuperado.
- Se le darán 4 litros de Colyte para que se prepare para el procedimiento de la cápsula.

B 3 días antes del procedimiento de la cápsula

- Deje de tomar suplementos de hierro.

C El día antes del procedimiento de la cápsula


- Deje de tomar antiácidos (Tums, Roloids), Pepto-Bismol y Carafate.
- Puede comer un desayuno normal por la mañana.
- **11 AM:** BEBA SOLAMENTE LÍQUIDOS CLAROS durante el resto del día y de la noche. NO COMA NADA SÓLIDO.
- Evite tomar líquidos de color rojo.
- **5-7 PM:** Beba 2 litros de Colyte en 2 horas. Puesto que Colyte es un laxante, tendrá que estar cerca de un baño.

D El día del procedimiento de la cápsula

- 1 hora antes de su procedimiento programado, beba 1 litro de Colyte.
- Puede continuar bebiendo líquidos claros. NO COMA NADA SÓLIDO.
- 2 horas después de la ingestión de la cápsula, beba el último litro de Colyte.
- Después de la 1 pm, puede comer un bocadillo ligero.
- Coma normalmente la cena.

E 8-72 horas después del procedimiento de la cápsula

- La cápsula normalmente tardará de 8 a 48 horas en salir. Si la cápsula no sale después de 72 horas, póngase en contacto con el Laboratorio de GI.
- Siga las instrucciones para obtener su cápsula una vez que salga y devuélvala al Laboratorio de GI.



GI LAB

Centro Médico
Ambulatorio de
Denver Health
660 N. Bannock St,
Pabellón L.

303-602-1926