

VACUNA COVID-19

HOJA DE HECHOS



La vacuna COVID-19 Pfizer es una vacuna ARNm que se administra por vía intramuscular en la parte superior del brazo. **Esta vacuna requiere 2 dosis con al menos 17 días de diferencia.**

La vacuna COVID-19 Moderna es una vacuna ARNm que se administra por vía intramuscular en la parte superior del brazo. **Esta vacuna requiere 2 dosis con al menos 21 días de diferencia.**

La vacuna Johnson & Johnson (Janssen) COVID-19 es una vacuna de vector adenoviral que se administra por vía intramuscular en la parte superior del brazo. **Esta vacuna requiere una sola inyección.**

Estas vacunas NO contienen huevos, látex ni conservantes.

EFFECTOS SECUNDARIOS COMUNES

En el brazo donde recibe la inyección:

- Dolor
- Enrojecimiento
- Hinchazón

En el resto de tu cuerpo:

- Fiebre
- Escalofríos
- cansancio
- Dolor de cabeza
- Náuseas



Consejos útiles

Si usted siente dolor o incomodidad después de que recibe su vacuna, consulte su doctor sobre tomar medicina sin receta como ibuprofeno o acetaminofeno. No se recomienda tomar estos medicamentos ANTES de recibir su vacuna.

Para reducir dolor o incomodidad donde recibió la vacuna:

- Aplique una toalla limpia, mojada, y fría sobre el área.
- Use o ejercite su brazo.

Para reducir incomodidad de fiebre:

- Bebe muchos líquidos.
- Vístese con ropa ligera.



Cuando llamar a un doctor

En la mayoría de los casos, la incomodidad de fiebre o dolor es normal. Comuníquese con su doctor o proveedor de cuidados médicos:

- Si el enrojecimiento o la sensibilidad donde recibió la vacuna aumenta después de 24 horas.
- Si sus efectos secundarios son graves, le preocupan o no se quitan después de unos días.


También puede llamar a la Línea de Enfermería de Denver Health al 303-389-1211.



Recuerda

Los efectos secundarios pueden sentirse como la gripe e incluso pueden afectar su capacidad de realizar sus actividades diarias. Obtenga su segunda vacuna incluso si tiene efectos secundarios con la primera vacuna, a no ser que el administrador de la vacuna o su doctor le diga que no obtenga la segunda vacuna. Su cuerpo necesita tiempo para generar protección después de cualquier vacuna. **Las vacunas de COVID-19 que requieren 2 dosis puede que no le protegen hasta dos semanas después de que recibe la segunda vacuna.**

Es importante que todos sigan usando todas las herramientas disponibles para ayudar a poner fin a esta pandemia por mientras que aprendemos más sobre como las vacunas de COVID-19 trabajan en condiciones del mundo actual. Tápese la boca y nariz con una mascarilla cuando este alrededor de los demás, mantenga una distancia de 6 pies de los demás, evite grupos grandes de personas, y lávese las manos a menudo.



HABLE CON SU PROVEEDOR DE SERVICIOS MÉDICOS PARA INICIAR V-SAFE

Use su smartphone/teléfono celular para avisarle al CDC sobre sus efectos secundarios después de haber recibido su vacuna de COVID-19. También recibirá recordatorios si requiere una segunda dosis. Para saber más sobre v-safe, visite: www.cdc.gov/vsafe