

PREPARACIÓN PARA SU SIGMOIDOSCOPIA FLEXIBLE

A Planifique con anticipación. Llame al **303-602-1926** si tiene preguntas o necesita programar o cambiar su cita.

- La cita es en Centro Médico Ambulatorio de Denver Health, 660 N. Bannock St., Pabellón L. El estacionamiento para pacientes y visitantes está detrás del edificio.
- Este es un procedimiento rápido que no requiere sedación ni otros medicamentos. **No** necesita que otra persona lo traiga ni lo acompañe para este procedimiento.
- Su consulta durará aproximadamente 1 hora.
- Necesitará una receta de Colyte. Obtenga Colyte en su farmacia una vez que haya programado su procedimiento.
- Hable con su médico si tiene preguntas sobre cómo tomar sus medicamentos antes del procedimiento.

B El día ANTES de la sigmoidoscopia flexible

- No hay restricciones alimenticias hasta **el día de** su procedimiento.
- Beba muchos líquidos extras durante todo el día antes del procedimiento.
- Prepare lo recetado según las instrucciones en la botella y guárdelo en el refrigerador durante la noche.

C El día de la sigmoidoscopia flexible **NO coma ningún alimento hasta después de su procedimiento**

- Necesita comenzar a beber lo recetado (Colyte) por lo menos 4 horas antes de la hora de su cita.
- Le tomará por lo menos 2 horas beber la **MITAD** del galón de Colyte. DEBE terminar el **MEDIO** galón **2 horas** antes de la hora de la cita.
- Beba 1 vaso lleno (8 onzas) cada 15 minutos hasta acabarse la **MITAD** del líquido preparado. Esté cerca de un baño.
- Puede continuar bebiendo líquidos claros hasta la hora de su cita.
- Puede tomar sus medicamentos de la mañana 30 minutos después de terminar su Colyte.
- Es de suma importancia que siga estas instrucciones para eliminar todas las heces del recto.

